

Forebyg græsforgiftning hos køer

Græsforgiftning forekommer især i perioden lige efter, at køerne kommer på græs om foråret. Det kan forebygges ved at tildele en magnesiumholdig mineralblanding fra 1-2 uger før til 3-4 uger efter udbinding.

Af Kaj Andersen, cand. agro.,
Vitfoss

Græsforgiftning er en sygdom, der skyldes mangel på magnesium i koens krop. Når mængden af magnesium i blodet falder, giver det forstyrrelser i impulserne fra nervesystem til muskler. Resultatet er muskeltræknings, der går over i kramper. På det stadium er sygdommen dødelig, hvis koen ikke behandles. Problemer med græsforgiftning kan således blive en dyr affære. Det er dog muligt at forebygge græsforgiftning med tilskud af en magnesiumrig mineralblanding i kritiske perioder.

Blokerer for magnesium

Græsforgiftning forekommer især i perioden lige efter, at køerne kommer på græs om foråret.

Årsagen til, at køerne kan komme i magnesiummangel lige efter, de er kommet på græs kan bl.a. skyldes, at det friske og meget proteinrige græs og kløver blokerer for koens optagelse af magnesium. Kulde og regn samt stress i forbindelse med udbindingen kan også være den udløsende faktor. Det kan derfor anbefales, at tildele en mineralblanding med et ekstra højt indhold af magnesium til køer i perioden fra 1-2 uger før til 3-4 uger efter udbinding for at forebygge.

Vælg den rigtige blanding

Sygdommen kan dog også forekomme på andre tidspunkter af året, for eksempel i besætninger, der står på stald hele året, og

hvor grovfoderet hovedsageligt består af græsensilage.

Det er ikke nok at fokusere på et ekstra tilskud af magnesium for at forebygge græsforgiftning. Der skal også fokus på brug af en god og lettilgængelig magnesiumkilde. Vi har desværre indimellem set eksempler på græsforgiftning hos køer, som godt nok har fået et ekstra tilskud af magnesium i den kritiske periode, men hvor der har været anvendt en billig magnesiumkilde med en alt for lav tilgængelighed.

DLG har fokus på, at mineral-sortimentet indeholder de rigtige magnesiumrige blandinger med de rigtige magnesiumkilder. Og det gælder både i relation til udbinding og et stort græsmarksfoder resten af året.

