Strøjern skal gives på rent og tørt gulv eller foderflise. Det skal samtidig være tæt ved grisenes hvilested – ikke bagest i stien.

Lettere at sikre jern til pattegrisene

Med strøjern fra Vitfoss opnår du samme gode virkning hos pattegrisene, som hvis du injicerer jernet.

Af Ib Karstensen,
produktkonsulent, Vitfoss

Sømælk indeholder for lidt jern til at dække pattegrisenes behov. Hvis du ikke giver ekstra jern, får grisene blodmangel (anæmi) – med nedsat tilvækst og øget dødelighed til følge.

Med Vitfoss' strøjernsprodukter opnår du den samme gode jernforsyning hos pattegrisen – målt som hæmoglobin i blodet – som ved injektion. Grisenes jernbehov er dækket, når hæmoglobinniveauet er over 80-90 g pr. l blod.

Sådan tildeles strøjern

Første tildeling sker 2-4 dage efter faring, og sidste tildeling er ved 8-12 dages-alderen. I den periode bør du ikke give andet tørfoder. Produktet PorcoFer tildeles i alt tre gange, mens andre strøjernsprodukter tildeles i alt fem gange.

Strøjern skal ikke gives på én gang, da der vil være risiko for, at enkelte grise optager for lidt jern. Tildelingen kan f.eks. ske på bestemte ugedage afhængig af rutinerne i besætningen. Strøjern gives på rent og tørt gulv eller foderflise. Det skal være tæt ved grisenes hvilested – ikke bagest i stien.

Forskellige produkter

Vitfoss' produkter, PorcoFer® og Fervital®, er fremstillet på basis af en speciel indkapslingsproces. Den sikrer, at produkterne er ensartede og velsmagende, og at jernindholdet er let tilgængeligt.

PorcoFer
Bruges i besætninger, hvor man udelukkende lægger vægt på jernforsyningen.

- Nemt at tildele
- Få tildelinger
- Grisenes naturlige rodeadfærd stimuleres
- Lav behandlingspris
- Risiko for ledbetændelse reduceres.

Fervital
Bruges i besætninger, hvor man ønsker en tidlig starter, der – foruden at sikre jernforsyningen – også indeholder diarrehæmmende fibre, probiotika, vitaminer og mikromineraler.

- Nemt at tildele
- Diarréhæmmende fibre og probiotika tilsat
- Vitaminer og mikromineraler tilsat
- Grisene vænnes til tidlig tørfoderoptagelse
- Grisenes naturlige rodeadfærd stimuleres
- Risiko for ledbetændelse reduceres

Resultat af hæmoglobinmålinger i fire besætninger.

Besætning	A		B		C		D	
Behandling	Strøjern	Injektion	Strøjern	Injektion	Strøjern	Injektion	Strøjern	Injektion
Kuld, antal	9	3	7	6	12	10	4	4
Grise, antal	98	37	61	58	116	92	40	45
Hæmoglobin, g pr. l blod:								
Gennemsnit	104	105	113	101	118	119	99	103
Pct. grise under 90	11	8	5	7	1	0	25	16
Pct. grise under 80	2	0	0	2	0	0	13	7
Pct. grise under 70	0	0	0	0	0	0	3	4